

# 黑寡妇毒蜘蛛有关知识市民问答（第2版）

2013. 3. 26

## 特征

问1. 黑寡妇毒蜘蛛有哪些特征？

答1. 腹部有红色沙漏状花纹或四角形花纹。

问2. 红背蜘蛛有哪些特征？

答2. 雌性红背蜘蛛体长（身体部分）约1 cm（包括腿脚部分，长达3~4 cm），全身黑色，腹部有红色花纹，背上有竖条状红色花纹。

问3. 几何寇蛛有哪些特征？

答3. 雌性几何寇蛛体长（身体部分）约1 cm（包括腿脚部分，长达3~4 cm），背上有灰色和黑色斑纹，腹部有红色花纹。

问4. 蜘蛛网有哪些特征？

答4. 蜘蛛网一般结在离地面很近的一些缝隙和楼房等角落里，形状不规则。冬季时大多会沾上落叶、枯草和昆虫尸体等。

## 栖息场所

问1. 它们栖息在那些地方？

答1. ①室外光线较好、暖和的地方  
②可以捕食的昆虫和小动物比较多的地方  
③有适当空间可供结网的空隙处、狭窄背阴处

具备以上①~③条件的沟渠、自行车挡泥板和车座内侧、公园等处长椅下面、滑梯下面、公园花坛和预制板矮墙、盆栽和花棚后面及凹处、一直放在室外的鞋子等里面。

## 发现后的处理方法

**问 1 . 发现黑寡妇毒蜘蛛后应该怎么办？**

**答 1 .** 发现后，别慌张，冷静对待，自我防卫，以免被咬。看到后千万别光着手去触碰。它们一动不动不代表已死，可能只是装死。可以使用家用喷雾式杀虫剂杀除。如果没有杀虫剂可以用脚踩死。处理已死的蜘蛛时，也要戴上手套、用一次性筷子或扫把等。如看到蜘蛛背上和腹部有特征性红花纹，安全起见，请联系所住地区区政府生活环境课。

**问 2 . 黑寡妇毒蜘蛛怎样杀除？**

**答 2 .** 喷射家用喷雾式杀虫剂或者用脚踩死。

**问 3 . 黑寡妇毒蜘蛛卵袋怎么处理？**

**答 3 .** 用一次性筷子等将卵袋夹入塑料袋里，用脚踩或者用点火枪烧。

**问 4 . 发现蜘蛛后，不管是什么蜘蛛都应该杀死吗？**

**答 4 .** 大多数蜘蛛都属于益虫，可以捕捉害虫，只要不是有毒蜘蛛，没有特别理由的话，请不要杀死它们。

## 平常注意事项

**问 1 . 为防被黑寡妇毒蜘蛛伤着，平常应该注意哪些地方？**

**答 1 .** 修剪庭院花草树木等室外作业时，要戴上厚手套（劳保手套、皮手套等），穿上袜子。一直放在屋外的鞋子，穿前要确认一下里面是否有蜘蛛。

## 被咬后的处理方法

**问 1. 被黑寡妇毒蜘蛛咬了时应该怎么办?**

**答 1.** 用温水和肥皂水清洗被咬部位，尽早去医院由医生诊断。

最好用家用喷雾式杀虫剂将蜘蛛杀死，去医院时带去，有利于医生诊断并进行适当治疗，如果用脚踩得粉碎的话，医生可能会无法判断蜘蛛种类。

**问 2. 不知道被什么东西咬了时应该怎么办?**

**答 2.** 安全起见，请用温水和肥皂水清洗被咬部位。不仅可以保持清洁还可以起到去毒作用。如果没有出现疼痛等症状时很有可能不是被黑寡妇毒蜘蛛所咬，如果有症状出现，请前去医院由医生诊断。

**问 3. 被咬时的症状?**

**答 3.** 可能会存在个体差别，一般来说，被咬后马上会有针刺般的疼痛感，被咬部位会有发热感觉，发红并肿起，会局部出汗。

被咬后 5 分钟左右，会有强烈的局部疼痛感，然后痛感增强，范围不断扩大，直至全身。

随着时间推移，痛感扩至四肢，然后出现淋巴结肿大和疼痛。

之后，出现腹痛，有些人可能会出现想呕吐、呕吐、发热、异常出汗、倦怠、头晕、头痛、全身发疹、高血压、拉肚子、咯血、呼吸困难、排尿困难、重度开口障碍、食欲不振、眼睑浮肿、全身关节痛、全身颤抖、流泪、精神异常、心动过缓（心跳变慢，脉律不齐）、心动过速（心跳加快，脉律不齐）等，出现严重症状时请拨打 119 呼叫救护车。

**问 4. 被咬后会不会致命?**

**答 4.** 日本国内至今为止，还未出现死亡案例。

在澳大利亚，大多红背蜘蛛被咬患者都使用抗毒素血清，自 1956 年开始使用抗毒素血清之后就未出现过死亡案例。

**问 5. 福冈市哪家医院储备有红背蜘蛛的抗毒素血清?**

**答 5.** 在福冈市内的福冈市民医院有储备。

## 蜘蛛有关质询

蜘蛛有关质询等，敬请通过以下邮箱地址联系。

**seikatsueisei.PHWB@city.fukuoka.lg.jp**