

# 食中毒の発生について

(令和8年3月8日(日) 午前10時現在)

保健医療局保健所地域衛生部博多衛生課  
担当：富田、加藤  
Tel419-1124 (内線142-480)  
保健医療局保健所地域衛生部食品安全推進課  
担当：平野、池田  
Tel711-4277 (内線199-161)

## 1 探知

令和8年3月4日(水)、北九州市保健衛生課から福岡市保健所に「令和8年3月1日(日)に福岡市博多区内の飲食店で食事をした11名中複数名が、下痢、嘔吐等の食中毒様症状を呈している。」との連絡があった。

## 2 概要

令和8年3月1日(日)正午頃に博多区内の飲食店を11名で利用したところ、5名が下痢、嘔吐等の食中毒様症状を呈し、5名とも医療機関を受診した。

調査の結果、福岡市保健所は以下の施設が提供した食事が原因のノロウイルスによる食中毒と断定し、2日間の営業停止処分とした。

## 3 摂食者数

11名

## 4 症状

下痢、嘔吐等

## 5 有症者数

5名(10代男性1名、30代男性1名、30代女性1名、40代男性2名)

※全員快方に向かっており、重症者はいない。

## 6 検査(福岡市保健環境研究所及び他自治体で検査)

(1) 有症者検便(5検体) : 5検体からノロウイルスを検出

(2) 調理従事者検便(8検体) : 1検体からノロウイルスを検出

(3) 施設ふき取り(8検体) : ウイルス陰性

## 7 原因食品

当該施設が令和8年3月1日(日)に提供した食事

牛ロースステーキ、皿うどん、水餃子、生春巻、鶏の唐揚げ、油淋鶏、炒飯、海鮮あんかけチャーハン、麻婆ビビンバ、海老のチリソース煮、蒸し鶏のネギ油かけ、餃子、豚の角煮、中華チマキ、焼豚、イモアメ、さくらゴマ団子、胡麻団子、コーヒーサンデー、抹茶ソフト、チョコサンデー

## 8 原因施設

- (1) 営業所所在地：福岡市博多区竹丘町二丁目3番9号 楓通り筑紫式番館 1階
- (2) 営業者氏名：有限会社一品香フードサービス 取締役 森 美紀
- (3) 屋号：一品香（イーピンシャン）
- (4) 業種：飲食店営業

## 9 原因施設に対する指導事項

- (1) 手洗いを徹底すること
- (2) 手洗い設備はレバー式など再汚染防止できる構造にすること
- (3) 調理従事者の健康チェックを徹底すること
- (4) ホールスタッフの健康チェックの記録をとること
- (5) HACCP に沿った衛生管理を実施すること

## 10 措置処分

福岡市保健所は、以下の理由により当該施設が提供した食事が原因のノロウイルスによる食中毒と断定し、令和8年3月8日（日）午前10時から3月10日（火）午前10時までの2日間の営業停止処分とした。

- (1) 有症者5名の共通食は3月1日に当該施設で調理された食事のみであること
- (2) 有症者5名及び調理従事者1名からノロウイルスが検出されたこと
- (3) 有症者の症状及び潜伏期間がノロウイルスによる食中毒と一致していること
- (4) 疫学調査の結果、有症者全員に感染症を疑う事象がないこと

〈参考〉福岡市における令和7年及び令和8年食中毒発生状況

月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	計
令和7年	(件数)	2	3	7	3	4	5	1	2	4	3	0	2	36
	(患者数)	111	42	32	27	47	13	1	6	21	3	0	19	322
令和8年	(件数)	2	1											3
	(患者数)	2	28											30

(注) 本件を含まない。調査中の事件を除く。

冬は特にご注意ください！

# ノロウイルス

による

# 食中毒


食中毒は夏だけではありません。

ウイルスによる食中毒が**冬に多発**しています！！

データでみると


ノロウイルスによる食中毒は、

◆患者数で第1位



原因別の食中毒患者数（年間）

◆冬期に多い



ノロウイルス食中毒の発生時期別の件数（年間）

◆大規模な食中毒になりやすい



食中毒1件あたりの患者数

※出典：食中毒統計（令和2～6年の平均。病因物質が判明している食中毒に限る）

## ノロウイルスによる食中毒予防のポイント

### 調理する人の

#### 健康管理

- 普段から感染しないように食べものや家族の健康状態に注意する。
- 症状があるときは、食品を直接取り扱う作業をしない。
- 毎日作業開始前に調理従事者の健康状態を確認し、責任者に報告する仕組みをつくる。

### 作業前などの

#### 手洗い

- 洗うタイミングは、
  - ◎ トイレに行ったあと
  - ◎ 調理施設に入る前
  - ◎ 料理の盛付けの前
  - ◎ 次の調理作業に入る前
  - ◎ 手袋を着用する前
- 汚れの残りやすいところをていねいに
  - ◎ 指先、指の間、爪の間
  - ◎ 親指の周り
  - ◎ 手首、手の甲

### 調理器具の

#### 消毒

- 洗剤などで十分に洗浄し、熱湯で加熱する方法又はこれと同等の効果を有する方法で消毒する。

詳しい情報は、厚生労働省ホームページ「ノロウイルスに関するQ&A」をご覧ください。  
[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/shokuhin/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html)

ノロウイルスQ&A

検索



# ノロウイルスの感染を広げないために

## 食器・環境・リネン類などの

## 消毒

- 感染者が使ったり、おう吐物が付いたものは、他のものと分けて洗浄・消毒します。
- 食器などは、食後すぐ、厨房に戻す前に塩素消毒液に十分浸し、消毒します。
- カーテン、衣類、ドアノブなども塩素消毒液などで消毒します。
  - 次亜塩素酸ナトリウムは金属腐食性があります。金属部（ドアノブなど）消毒後は十分に薬剤を拭き取りましょう。
- 洗濯するときは、洗剤を入れた水の中で静かにもみ洗いし、十分すすぎます。
  - 85℃で1分間以上の熱水洗濯や、塩素消毒液による消毒が有効です。
  - 高温の乾燥機などを使用すると、殺菌効果は高まります。

## おう吐物などの

## 処理

- 患者のおう吐物やおむつなどは、次のような方法で、すみやかに処理し、二次感染を防止しましょう。ノロウイルスは、乾燥すると空中に漂い、口に入って感染することがあります。
  - 使い捨てのマスクやガウン、手袋などを着用します。
  - ペーパータオルなど（市販される凝固剤を使用することも可能）で静かに拭き取り、塩素消毒後、水拭きをします。
  - 拭き取ったおう吐物や手袋などは、ビニール袋に密閉して廃棄します。その際、できればビニール袋の中で1,000ppmの塩素消毒液に浸します。
  - しぶきなどを吸い込まないようにします。
  - 終わったら、ていねいに手を洗います。

## 塩素消毒の方法

次亜塩素酸ナトリウムを水で薄めて「塩素消毒液」を作ります。なお、家庭用の次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂白剤でも代用できます。

\*濃度によって効果が異なりますので、正しく計りましょう。

	食器、カーテンなどの消毒や拭き取り		おう吐物などの廃棄 (袋の中で廃棄物を浸す)	
	200ppmの濃度の塩素消毒液		1000ppmの濃度の塩素消毒液	
製品の濃度	液の量	水の量	液の量	水の量
12%	5ml	3L	25ml	3L
6%	10ml	3L	50ml	3L
1%	60ml	3L	300ml	3L



- ▶ 製品ごとに濃度が異なるので、表示をしっかりと確認しましょう。
- ▶ 次亜塩素酸ナトリウムは**使用期限内のもの**を使用してください。
- ▶ おう吐物などの酸性のものに直接原液をかけると、**有毒ガスが発生することがあります**ので、必ず「使用上の注意」をよく確認してから使用してください。
- ▶ 消毒液を保管しなければならない場合は、消毒液の入った容器は、**誤って飲むことがないように**、消毒液であることをはっきりと明記して保管しましょう。

## ノロウイルスによる感染について

感染経路	症状
<p>&lt;食品からの感染&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 感染した人が調理などをして汚染された食品</li> <li>● ウイルスの蓄積した、加熱不十分な二枚貝など</li> </ul> <p>&lt;人からの感染&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 患者のふん便やおう吐物からの二次感染</li> <li>● 家庭や施設内などでの飛沫などによる感染</li> </ul>	<p>&lt;潜伏時間&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 感染から発症まで24~48時間</li> </ul> <p>&lt;主な症状&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 吐き気、おう吐、下痢、腹痛、微熱が1~2日続く。感染しても症状のない場合や、軽い風邪のような症状のこともある。</li> <li>● 乳幼児や高齢者は、おう吐物を吸い込むことによる肺炎や窒息にも要注意。</li> </ul>