

平成16年度 食中毒・苦情検査結果

保健科学部門 細菌担当

平成16年度 食中毒・有症苦情 検査結果

No	保健所	受付日	喫食または購入施設	喫食者数	発症者数	潜伏時間	主症状	原因と疑われた食品	検体(陽性数/検体数)	推定病因物質	備考
1	南	4/2	スーパー	1	1	1時間	下痢,嘔吐		有症者便(0/1) 残品(0/1)	不明	
2	東	4/12	公園内売店	7	5	2時間	下痢	ソフトクリーム	有症者便(0/2) ふきとり(0/10) 参考品(0/1)	不明	
3	東	4/20	スーパー	4	4	1時間	下痢		有症者便(0/4) 残品(0/1)	不明	
4	東	4/21	飲食店	3	3	12時間	下痢,嘔吐 発熱	すし	有症者便(0/3) ふきとり(0/6) 従業員便(0/2) 水槽の水(0/1) トイレ有症者便(0/3) トイレ従業員便(0/2)	不明	
5	博多	4/27	自宅	2	1	6時間	下痢,嘔吐 発熱		有症者便(0/1) 吐物(0/1)	不明	
6	中央	4/27	自宅	2	2	30分間	下痢,発熱		有症者便(2/2) 参考品(0/1) ふきとり(1/7) 菌株(2)	セレウス	セレウリド検出
7	南	5/7	飲食店	3	3	38時間	下痢	中華料理	有症者便(2/3)	カビ菌(カビ)	C. jejuni
8	南城	5/10	旅館	48	27	36時間	下痢,嘔吐 発熱		有症者便(2/8) トイレ有症者便(5/8)	EPEC ノロウイルス	086 aggR(+) 北九州市の事例
9	中央	5/11	飲食店	146	28		下痢,発熱		有症者便(1/1)	S. Enteritidis	香川県での事例
10	東	5/14	スーパー	2	2	9時間	下痢,嘔吐	焼き肉	有症者便(0/2) 残品(0/1) 参考品(0/1)	不明	
11	城南	5/16	飲食店	2	2	7時間	嘔吐,下痢		有症者便(0/2)	不明	
12	南	5/18	飲食店	4	3	36時間	下痢,嘔吐 発熱	とり刺し	参考品(0/2) ふきとり(0/3) 従業員便(0/4)	不明	患者については、埼玉県で調査したが不明
13	城南	5/26	飲食店	2	2	4時間	下痢,腹痛	弁当	患者便(0/1)	不明	
14	中央	6/4	飲食店	2	2	48時間	下痢,発熱	コッケー	ふきとり(0/4) 参考品(0/1)	0157	医療機関で検出
15	博多	6/7	自宅	3	2	1時間	下痢,嘔吐		残品(0/1)	不明	

No	保健所	受付日	喫食または購入施設	喫食者数	発症者数	潜伏時間	主症状	原因と疑われた食品	検体(陽性数/検体数)	推定病因物質	備考
16	南	6/7	飲食店	4	3	24時間	下痢,発熱 嘔吐,嘔気	とり料理	有症者便(2/3) 従業員便(1/3) 参考品(1/3) ふきとり(0/3) 菌株(1)	カビ菌	<i>C. jejuni</i>
17	東	6/8	飲食店	2	1	2時間	下痢,発熱 嘔吐,胃痛		有症者便(0/1)	不明	
18	東	6/10	製菓店	40	15	0時間	嘔吐,嘔気	まんじゅう	参考品(同一ロット)(0/7)	不明	
19	早良	6/15	家庭	15	6	12時間	下痢,吐気 腹痛		有症者便(0/7) 参考品(0/3)	不明	
20	西	6/18	家庭	2	2	2時間	下痢,腹痛	卵	参考品(0/2)	不明	
21	中央	6/18	飲食店	10	2	2時間	下痢,嘔吐	さしみ 天ぷら 鍋	有症者便(0/2) 従業員便(0/3) ふきとり(0/3)	不明	
22	中央	6/21	仕出し店	23	9	8時間	下痢,腹痛 嘔吐	弁当	有症者便(0/8) 従業員便(0/8) ふきとり(0/21)	不明	
23	博多	6/21	飲食店	3	2	4時間	下痢,腹痛 吐気,発熱		有症者便(0/2) 従業員便(0/8) 参考品(0/1) ふきとり(0/5)	不明	
24	南	6/30	仕出し店	136	36	13時間	下痢,発熱 腹痛	弁当	有症者便(1/1) カビ有症者便(0/1)	<i>S. Enteritidis</i>	京都市での事例
25	城南 早良	7/5	飲食店	15	9	5時間	下痢,発熱 嘔吐		有症者便(0/5) 参考品(0/2) ふきとり(0/4)	不明	
26	博多	7/6	飲食店	3	3	40時間	下痢,発熱 腹痛	とり料理	有症者便(3/3) 従業員便(0/4) 参考品(0/4) ふきとり(0/6) 菌株(2)	<i>S. Infantis</i> カビ菌	<i>C. jejuni</i>
27	南	7/17	職場旅行 (香港)	63	23		下痢		有症者便(7/23)	下痢原性大腸菌	06および0159 Sth(+)
28	南	7/17			10	12時間	下痢,嘔吐 腹痛		有症者便(4/5) 従業員便(1/2) 参考品(1/1) ふきとり(0/5)	<i>S. Enteritidis</i>	
29	中央	7/20		2	2	15分間	下痢		有症者便(0/2) 同一ロット品(0/3)	不明	
30	中央	7/23	飲食店	4	1		下痢, 腹痛		従業員便(0/3) 参考品(0/1) ふきとり(0/4)	不明	

№	保健所	受付日	喫食または購入施設	喫食者数	発症者数	潜伏時間	主症状	推定原因食品	検体(陽性数 / 検体数)	推定病因物質	備考
31	東	7/23	飲食店	3	3	4時間	嘔吐,下痢		有症者便(0/3) ふきとり(0/6)	不明	
32	東	7/29	飲食店	6	4	72時間	下痢,発熱		有症者便(1/3) ふきとり(0/4)	カビ [※] 01 [※] クター	<i>C. jejuni</i>
33	南	8/3	保育園	82	14	15分間	下痢 じんましん		有症者便(0/7) 残品(0/4)	不明	
34	博多	8/4	スーパー	1	1	4時間	嘔吐,下痢		残品(0/2)	不明	
35	中央	8/17	飲食店	2	2	4時間	嘔吐,下痢		有症者便(0/1)	不明	
36	東	8/18	家庭	1	1				菌株(1)	腸炎ビブリオ	04:K9
37	博多	8/18	旅館		4	3時間	下痢,嘔吐		有症者便(0/2)	黄色ブドウ球菌	佐賀市で患者より 黄色ブドウ球菌検出
38	早良	8/19	旅館	8	5	24時間	下痢,嘔吐		有症者便(0/2) 無症者便(0/1)	腸炎ビブリオ	松山市で患者より 腸炎ビブリオ検出
39	博多	8/23	スーパー	7	7	12時間	下痢,腹痛 吐気	刺身, すし等	従業員便(0/7) 参考品(0/3) ふきとり(0/3)	腸炎ビブリオ	医療機関で検出
40	南	8/19	販売店	1					参考品(0/4)	不明	
41	博多	8/30	飲食店		4	19時間	下痢,腹痛 発熱, 嘔吐	シュークリーム	有症者便(0/4) 従業員便(2/5) 参考品(0/3) ふきとり(0/15)	<i>S. Enteritidis</i>	有症者便, 残品(ともに 大分市)からも <i>S. Enteritidis</i> 検出
42	中央	8/31	飲食店	7	5	8時間	下痢,腹痛 発熱		有症者便(1/1)	<i>S. paratyphi B</i>	福岡県で他の患者より サルモネラ(04群) 検出
43	東	9/4	飲食店	11	4	36時間	下痢,腹痛		有症者便(6/11) 従業員便(2/4) 参考品(1/6) ふきとり(0/10)	カビ [※] 01 [※] クター	<i>C. jejuni</i>
44	東	9/17		1	1		下痢,発熱		菌株(1)	<i>S. Enteritidis</i>	
45	博多	10/1		5	2	3時間	下痢,嘔吐	弁当	有症者便(0/2) 従業員便(0/5) 保存食(0/12) ふきとり(0/10)	不明	
46	博多	10/2	飲食店	6	4	12時間	下痢		ふきとり(0/4) 従業員便(0/3)	不明	患者は市外住民
47	中央	10/17	販売店	1	1	12時間	下痢,嘔吐, 腹痛		有症者便(0/1) 参考品容器(0/2)	不明	
48	博多	10/20	飲食店	8	8	12時間	嘔吐,下痢		有症者便(5/7) 有症者吐物(3/3) 従業員便(0/7) 参考品(0/4) ふきとり(0/12)	黄色ブドウ球菌	コアグラーゼ 陰性かつ A,C
49	早良	10/22	スーパー	1	1	3時間	下痢	刺身	有症者便(0/1)	不明	

No	保健所	受付日	喫食または購入施設	喫食者数	発症者数	潜伏時間	主症状	推定原因食品	検体(陽性数/検体数)	推定病因物質	備考
50	中央	10/28	飲食店	2	1	96時間	下痢,嘔吐 寒気		従業員便(0/14) ふきとり(0/2)	不明	
51	中央 東	11/23	披露宴 (発生場所)	97	16		下痢,嘔吐		有症者便(0/12) 無症者便(0/2) 従業員便(0/14) ウイルス無症者便(1/2) ウイルス有症者便(10/13) ウイルス従業員便(0/5) ふきとり(0/18) 残品(0/1)	ノロウイルス	
52	博多	11/24	飲食店	2	2	4時間	下痢,発熱		有症者便(0/1)	不明	
53	西	12/4	老人福祉施設						有症者便(0/1) ウイルス有症者便(3/3) ウイルス従業員便(0/7)	ノロウイルス	
54	東	12/9	飲食店	30	17	36時間	嘔吐,下痢, 発熱		有症者便(0/1) ウイルス有症者便(1/1)	ノロウイルス	東京都での事例
55	東	12/16	飲食店 (弁当)	48	30	16時間	嘔吐,下痢, 発熱	弁当	有症者便(0/9) 従業員便(0/4) ウイルス有症者便(5/9) ウイルス従業員便(1/3) 残品(0/2) ウイルス残品(0/2)	ノロウイルス	
56	南	12/24	ホテル (披露宴)	691	164	33時間	嘔吐,下痢, 発熱		有症者便(0/1) ウイルス有症者便(1/1)	ノロウイルス	神戸市での事例
57	博多	12/24	飲食店	22	16	24時間	嘔吐,下痢		有症者便(0/1) ウイルス有症者便(1/1)	ノロウイルス	福岡県での事例
58	城南	12/24	福祉施設 (発生場所)	44	14		嘔吐,下痢		有症者便(0/8) 従業員便(0/3) ウイルス有症者便(5/8) ウイルス従業員便(1/4) ふきとり(0/9) ウイルスふきとり(1/4) 検食(0/9) ウイルス検食(0/5)	ノロウイルス	
59	南	12/27	スーパー	1	1	0時間	嘔吐,下痢, 腹痛		残品(0/1)	不明	
60	西	12/28							有症者便(0/4) ウイルス有症者便(1/1) ウイルス職員便(3/3)	ノロウイルス	
61	東	1/11	飲食店	1	1	5時間	下痢		有症者便(0/1) 参考品(0/1)	不明	
62	西	1/12		3	1		嘔吐,下痢	馬刺	有症者便(0/2) 参考品(0/3)	不明	
63	西	1/15	飲食店	40	5	36時間	嘔吐		有症者便(0/5) 従業員便(0/4) ウイルス有症者便(5/7) ウイルス従業員便(0/4) ウイルス参考品(0/1) ふきとり(0/4)	ノロウイルス	
64	西	1/17		2	2	4時間	下痢,嘔吐		患者吐物(0/2) ウイルス患者吐物(0/2)	不明	
65	中央	1/19	飲食店	2	2	1時間	下痢,嘔吐		有症者便(0/2) 従業員便(0/2) ふきとり(0/3) 参考品(0/2)	不明	

No	保健所	受付日	喫食または購入施設	喫食者数	発症者数	潜伏時間	主症状	推定原因食品	検体(陽性数/検体数)	推定病因物質	備考
66	南	1/19	修学旅行	43	10		嘔吐,下痢 発熱		有症者便(0/7) ウイルス有症者便(4/4)	ノロウイルス	
67	博多	3/1	飲食店	8	7	12時間	嘔吐		有症者便(0/7) ふきとり(0/6) ウイルス有症者便(6/7) ウイルス従業員便(1/3)	ノロウイルス	
68	中央	3/11	ツアー旅行	29	8		嘔吐,下痢 発熱		有症者便(0/1) ウイルス有症者便(0/1)	ノロウイルス	宮城県より依頼 宮城県でノロウイルスを検出
69	東	3/11	飲食店	2	1	5時間	腹痛,嘔吐		有症者便(0/1)	不明	

平成16年度 無症苦情 検査結果

No	保健所	受付日	苦 情 品	状 況	結 果									
1	博多	4/27	ラムネ	ビンの底にカビ様のものがある。	鏡検，培養検査にてカビの菌糸を認める。									
2	中央	5/24	たれ付牛肉	味がおかしい。	<table><tr><td>一般細菌数(CFU/g)</td><td>苦情品 1.3×10⁷</td><td>参考品 1 2.9×10⁶</td><td>参考品 2 6.0×10⁶</td></tr><tr><td>官能試験</td><td>腐敗臭あり</td><td>腐敗臭なし</td><td>腐敗臭なし</td></tr></table>	一般細菌数(CFU/g)	苦情品 1.3×10 ⁷	参考品 1 2.9×10 ⁶	参考品 2 6.0×10 ⁶	官能試験	腐敗臭あり	腐敗臭なし	腐敗臭なし	
一般細菌数(CFU/g)	苦情品 1.3×10 ⁷	参考品 1 2.9×10 ⁶	参考品 2 6.0×10 ⁶											
官能試験	腐敗臭あり	腐敗臭なし	腐敗臭なし											
3	中央	7/6	つゆ（希釈用）	カビ様の膜が浮いている。	鏡検，培養検査にてカビの菌糸を認める。									
4	博多	8/2	牛丼	味がおかしい。	<table><tr><td>一般細菌数(CFU/g)</td><td>苦情品 1.8×10⁹</td><td>参考品 3.0×10³ 未満</td></tr><tr><td>大腸菌群</td><td>陰性</td><td>陰性</td></tr><tr><td>ブドウ球菌</td><td>陰性</td><td>陰性</td></tr></table>	一般細菌数(CFU/g)	苦情品 1.8×10 ⁹	参考品 3.0×10 ³ 未満	大腸菌群	陰性	陰性	ブドウ球菌	陰性	陰性
一般細菌数(CFU/g)	苦情品 1.8×10 ⁹	参考品 3.0×10 ³ 未満												
大腸菌群	陰性	陰性												
ブドウ球菌	陰性	陰性												
5	博多	8/26	トマトミックスジュース	異物が入っている。	肉眼所見から，赤色を呈する野菜の断片と考えられた。									
6	博多	9/3	ビーフン	腐っているようだ。	<table><tr><td>一般細菌数(CFU/g)</td><td>苦情品 1.9×10⁹</td><td>同一ロット品 1.4×10⁹</td></tr><tr><td>大腸菌群 (CFU/g)</td><td>2.4×10⁷</td><td>1.6×10⁷</td></tr></table>	一般細菌数(CFU/g)	苦情品 1.9×10 ⁹	同一ロット品 1.4×10 ⁹	大腸菌群 (CFU/g)	2.4×10 ⁷	1.6×10 ⁷			
一般細菌数(CFU/g)	苦情品 1.9×10 ⁹	同一ロット品 1.4×10 ⁹												
大腸菌群 (CFU/g)	2.4×10 ⁷	1.6×10 ⁷												
7	中央	11/8	ミンチ肉 (豚肉挽肉餃子用)	変なにおいがする。	<table><tr><td>一般細菌数(CFU/g)</td><td>苦情品 5.1×10⁷</td><td>同一ロット品 2.7×10⁷</td><td>参考品 2.1×10⁷</td></tr></table>	一般細菌数(CFU/g)	苦情品 5.1×10 ⁷	同一ロット品 2.7×10 ⁷	参考品 2.1×10 ⁷					
一般細菌数(CFU/g)	苦情品 5.1×10 ⁷	同一ロット品 2.7×10 ⁷	参考品 2.1×10 ⁷											
8	早良	2/3	ちくわ	カビが生えている。	鏡検，培養検査にてカビを検出。 <i>Penicillium</i> 属と推定。									
9	早良	3/22	ミネラルウォーター	下痢・腹痛を起こした。	食中毒菌 陰性									