

資料 10 植生調査票

植生調査票を次頁以降に示す。

st. 8	調査地 福岡	府 福岡	郡 市 西区大字拾六	町 村	図幅 1:5万	上右 下左		
(地形)	山頂：尾根・斜面・上・中・下・凸・凹・谷・平地	(風当) 強・中・弱			(海拔)	80 m		
(土壌)	ボドゾル・褐森土・赤・黄色土・黒色土・暗赤色土・グライ	(日当) 陽・中陰・陰			(方位)	S50E		
	泥炭土・未熟土(受蝕土・礫質・砂質・埴質)・その他(河川・沼沢)	(土湿) 乾・適・湿・過湿			(傾斜)	30 °		
	階 層	高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸径(cm)	(面積)	100 m ²	
B ₁	高木層	15	100	タブノキ	-	(備 考)	(出現種数)	17
B ₂	亜高木層	-	-	-	-			
S	低木層	10	60	-	-			
K	草本層	1	70	ウラジロ	-			
M	コケ層	-	-	-	-			

(群 落 名) シイ・カシ二次林 2023 年 6 月 27 日 調査者 大野

[illegible]

植 生 調 査 票

下左

(出現種数) 19

B ₁	高木層	17	75	コナラ	-
B ₂	亜高木層	13	20	ハゼノキ	-
S	低木層	4	80	ヒサカキ	-
K	草本層	0.5	35	コシダ	-
M	コケ層	-	-	-	-

K

[illegible]

st. 10	調査地 福岡	府 福岡	郡 西市区大字拾六	町 村
(地形) 山頂:尾根・斜面・上・中・下・凸・凹・谷・平地	(風当) 強・中・弱			
(土壌) ボドゾル・褐森土・赤・黄色土・黒色土・暗赤色土・グライ	(日当) 陽・中陰・陰			
泥炭土・未熟土(受蝕土・礫質・砂質・埴質)・その他(河川・沼沢)	(土湿) 乾・適・湿・過湿			
階 層	高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸径(cm)
B ₁ 高木層	13	70	カラスザンショウ	-
B ₂ 亜高木層	8	45	ハゼノキ	-
S 低木層	4	80	スギ	-
K 草本層	1	25	ツワブキ	-
M コケ層	-	-	-	-

(備 考)

図幅	上右
1:5万	下左
(海拔)	75 m
(方位)	NW
(傾斜)	35 °
(面積)	50 m ²
(出現種数)	25

2023 年 6 月 27 日 調査者 大野

資10-11

st. 13	調査地 福岡	府 福岡	郡 市	町 村	西区大字拾六	図幅 1:5万	上右 下左
(地形)	山頂・尾根・斜面・上・中・下・凸・凹・谷	平地	(風当)	強・中・弱	(海拔)	40	m
(土壌)	ボドゾル・褐森土・赤・黄色土・黒色土・暗赤色土・グライ	(日当)	陽・中陰・陰	(方位)	-		
泥炭土・未熟土(受蝕土・礫質・砂質・埴質)・その他(河川・沼沢)	(土湿)	乾・適・湿	過湿	(傾斜)	0	°	
階 層	高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸径(cm)	(面積)	4	m ²
B ₁ 高木層	-	-	-	-	(備考)		
B ₂ 亜高木層	-	-	-	-	水深1~2m		
S 低木層	-	-	-	-			
K 草本層	-	60	ヒシ	-			
M コケ層	-	-	-	-			

(群 落 名) ヒシ群落 2023 年 6 月 27 日 調査者 平野

[illegible]

st. 16	調査地 福岡	府 福岡	郡 市	町 村	西区大字拾六	図幅	上右
		県	市	町	村	1:5万	下左
(地形)	山頂・尾根・斜面・上・中・下・凸・凹・谷	平地	(風当)	強・中・弱	(海拔)	40	m
(土壌)	ボドゾル・褐森土・赤・黄色土・黒色土・暗赤色土・グライ	(日当)	陽・中陰・陰	(方位)	-		
泥炭土・未熟土(受蝕土・礫質・砂質・埴質)	その他(河川・沼沢)	(土湿)	乾・適・湿・過湿	(傾斜)	0	°	
階 層	高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸径(cm)	(面積)	9	m ²
B ₁ 高木層	-	-	-	-	(備考)		
B ₂ 亜高木層	-	-	-	-	水深5~20cm		
S 低木層	-	-	-	-	池畔に細長く分布		
K 草本層	2.5	100	ヒトモトススキ	-			
M コケ層	-	-	-	-			

(群 落 名) ヒトモトススキ群落 2023 年 6 月 27 日 調査者 平野

[illegible]

st. 18	調査地 福岡	府 福岡	郡 市 西區大字拾六	町 村	図幅 1:5万	上右 下左
(地形)	山頂:尾根・斜面・上・中・下・凸・凹・谷・平地	(風当) 強・中・弱			(海拔)	95 m
(土壌)	ボドゾル・錫森土・赤・黄色土・黒色土・暗赤色土・グライ	(日当) 陽・中陰・陰			(方位)	N30W
泥炭土・未熟土(受蝕土・礫質・砂質・埴質)・その他(河川・沼沢)		(土湿) 乾・適・湿・過湿			(傾斜)	40 °
階 層	高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸径(cm)	(面積)	225 m ²
B ₁ 高木層	18	60	ツブラジイ	-	(備 考)	(出現種数) 25
B ₂ 亜高木層	12	40	-	-		
S 低木層	5	40	ヤブムラサキ	-		
K 草本層	1	10	ウラジロ	-		
M コケ層	-	-	-	-		

(群 落 名) シイ・カシ二次林

2023 年 6 月 27 日 調査者 平野

[illegible]

st. 19	調査地 福岡	府 福岡	郡 市 西區大字拾六	町 村	図幅 1:5万	上右 下左
(地形)	山頂：尾根・斜面・上・中・下・凸・凹・谷・平地	(風当) 強・中・弱			(海拔)	115 m
(土壌)	ボドゾル・錫森土・赤・黄色土・黒色土・暗赤色土・グライ	(日当) 陽・中陰・陰			(方位)	SE
泥炭土・未熟土(受蝕土・礫質・砂質・埴質)・その他(河川・沼沢)	(土湿) 乾・適・湿・過湿			(傾斜)	15~30 °	
階 層	高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸径(cm)	(面積)	225 m ²
B ₁ 高木層	18	80	タブノキ	-	(備 考)	(出現種数) 35
B ₂ 亜高木層	13	40	ノグルミ	-		
S 低木層	7	30	イヌビワ	-		
K 草本層	1	10	-	-		
M コケ層	-	-	-	-		

(群 落 名) シイ・カシ二次林

2023 年 6 月 27 日 調査者 平野

[illegible]

st. 20	調査地 福岡	府 福岡	郡 市 西区大字拾六	町 村	図幅 1:5万	上右 下左
(地形)	山頂：尾根・斜面・上・中・下・凸・凹・谷・平地	(風当) 強・中・弱			(海拔)	170 m
(土壌)	ボドゾル・錫森土・赤・黄色土・黒色土・暗赤色土・グライ	(日当) 陽・中陰・陰			(方位)	E
泥炭土・未熟土(受蝕土・礫質・砂質・埴質)・その他(河川・沼沢)	(土湿) 乾・適・湿・過湿			(傾斜)	20 °	
階 層	高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸径(cm)	(面積)	225 m ²
B ₁ 高木層	16	70	コナラ	-	(出現種数)	29
B ₂ 亜高木層	10	30	クロキ	-		
S 低木層	6	50	-	-		
K 草本層	0.6	1	-	-		
M コケ層	-	-	-	-		

(群 落 名) コナラ群落 2023 年 6 月 27 日 調査者 平野

[illegible]

st. 21	調査地 福岡	府 福岡	郡 市 西区大字拾六	町 村	図幅 1:5万	上右 下左
(地形)	山頂・尾根・斜面・上・中・下・凸・凹・谷・平地	(風当)	強・中・弱	(海拔)	160	m
(土壌)	ボドゾル・錫森土・赤・黄色土・黒色土・暗赤色土・グライ	(日当)	陽・中陰・陰	(方位)	N	
泥炭土・未熟土(受蝕土・礫質・砂質・埴質)・その他(河川・沼沢)	(土湿)	乾・適・湿・過湿	(傾斜)	10~35	°	
階 層	高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸径(cm)	(面積)	200
B ₁ 高木層	13	70	コナラ	-	(出現種数)	30
B ₂ 亜高木層	8	30	ヤマモモ	-		
S 低木層	4	40	ネジキ	-		
K 草本層	0.6	20	-	-		
M コケ層	-	-	-	-		

(群 落 名) コナラ群落 2023 年 6 月 27 日 調査者 平野

[illegible]

st. 22	調査地 福岡	府 福岡	郡 市 西 区 大 字 拾 六	町 村	図幅 1:5万	上 右 下 左
(地形)	山 頂 : 尾 根・ <u>斜 面</u> ・上・中・ <u>下</u> ・凸・凹・谷・平地	(風当) 強・ <u>中</u> ・弱			(海拔)	95 m
(土壌)	ボドゾル・ <u>褐 森 土</u> ・赤・黄色土・黒色土・暗赤色土・グライ	(日当) 陽・ <u>中 陰</u> ・陰			(方位)	N60E
泥炭土・未熟土(受蝕土・礫質・砂質・埴質)・その他(河川・沼沢)	(土湿) 乾・ <u>適</u> ・湿・過湿			(傾斜)	28 °	
階 層	高 さ (m)	植 被 率 (%)	優 占 種	胸 径 (cm)	(面積)	225 m ²
B ₁ 高 木 層	18	70	タブノキ	-	(備 考)	(出現種数)
B ₂ 亜高木層	10	40	クロキ	-		20
S 低 木 層	4	30	クロキ	-		
K 草 本 層	0.8	5	ベニシダ	-		
M コケ層	-	-	-	-		

(群 落 名) シイ・カシ二次林 2023 年 6 月 27 日 調査者 平野

[illegible]