

令和8年2月27日 15:00現在

保健医療局 保健所 感染症対策課 担当：古賀、柚木 電話 092-791-7081

麻しん（はしか）患者の来訪について

令和8年2月24日、東京都内で麻しん患者の発生があり、患者の行動歴を確認したところ、福岡市への来訪がありました。周囲に感染させる可能性のある時期に、次のとおり不特定多数の方と接触した可能性があることが判明しましたので、お知らせします。

1 患者が利用し、不特定多数の方と接触した可能性のある施設等

2月20日（金曜日）

福岡空港 国内線旅客ターミナルビル	(12:00頃から12:30頃)
福岡市地下鉄空港線 福岡空港駅～中洲川端駅	(12:30頃から13:00頃)
〃 中洲川端駅～博多駅	(14:15頃から15:00頃)

2月21日（土曜日）

福岡市地下鉄空港線 博多駅～中洲川端駅	(10:20頃から10:30頃)
〃 中洲川端駅～博多駅	(12:00頃から12:30頃)
〃 博多駅～福岡空港駅	(15:30頃から16:00頃)
福岡空港 国内線旅客ターミナルビル	(16:00頃から16:45頃)

※ 各施設等へのお問合せはご遠慮ください。現在、当該施設を利用しても感染の恐れはありません。

※ 上記日時に当該施設等を利用された方は、体調に注意し、麻しんを疑う症状（別紙1）が現れた場合、必ず事前に医療機関に連絡し、麻しんの疑いがあることを伝えた上で、受診してください。

※ 受診の際は、公共交通機関等の利用を控え、医療機関の指示に従ってください。

2 患者概要

年齢	性別	症状	海外渡航歴	ワクチン接種歴	発病日
40代	男	発熱、発しん、咳、鼻汁、結膜充血	なし	不明	2月18日

※ 患者の詳細については、東京都の報道発表（別紙2）をご確認ください。

《市民のみなさまへ》

麻しんは予防接種で防げる病気です。麻しんの定期予防接種（第1期：1歳児、第2期：小学校就学前の1年間）の対象で、未接種の方は、かかりつけ医に相談し、早めに予防接種を受けましょう。

本情報提供は、感染症の拡大防止のために行うものであり、患者やその家族・関係者等を特定する行為や各施設への風評被害がないよう、格段の御配慮をお願いします。

麻疹（はしか）について

- 麻疹（はしか）は、感染力はきわめて強い感染症で、感染すると10～12日後に、発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れ、2～4日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発疹が出現するとされています。
- 麻疹ウイルスの感染により免疫が一時的に低下し、細菌やウイルス等による二次感染を受けやすくなり、また合併症により重症化する可能性があります。
- 肺炎や脳炎などの重篤な合併症がみられることがあり、注意が必要です。

《感染予防とまん延防止のために》

- 麻疹は、感染力がきわめて強く、手洗いやマスクのみでの予防はできず、症状が出る前日から、ヒトからヒトへ感染させるとされています。
- 予防接種は、自分が感染しないためだけでなく、周りの人に感染を広げないためにも有効です。
- 医療・教育関係者や、海外渡航を計画されている方は、麻疹の予防接種歴を確認し、明らかでない場合は予防接種を検討してください。
- 麻疹の予防接種歴がない方で、麻疹を疑う症状が現れた場合、事前に医療機関に連絡し、指示に従って受診してください。

《麻疹の予防接種について》

- 1歳になったら1回、小学校入学前の1年間にもう1回予防接種を受けましょう。
「生後12月から生後24月に至るまでの間にある者」及び「5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者」は、予防接種法に基づく定期の予防接種を受けることができます。
- 上記以外の方で、麻疹の予防接種を希望される場合は、任意接種（費用は自己負担）を医療機関で受けることができます。
- 麻疹の流行がみられる国に渡航される方は、予防接種をご検討ください。なお、海外の流行情報は検疫所のホームページ（<http://www.forth.go.jp/>）で確認することができます。

《参考情報》

麻疹について（厚生労働省ホームページ）

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou/measles/index.html

麻疹とは（国立健康危機管理研究機構ホームページ）

<https://id-info.jihs.go.jp/infectious-diseases/measles/detail/index.html>

令和 8 年 2 月 26 日
保 健 医 療 局

麻しん（はしか）患者の発生について

令和 8 年 2 月 24 日（火曜日）に都内で麻しん患者（検査診断例）の発生がありました。
管轄保健所において疫学調査を実施し、接触者の健康観察を実施しています。

また、患者の行動歴を確認したところ、周囲に感染させる可能性のある時期に下記の公共交通機関において不特定多数の方と接触した可能性があることが判明しましたのでお知らせします。

【患者の概要】

性別	年齢	症状	海外 渡航歴	ワクチン 接種歴	発病日
男性	40代	発熱、咳、鼻汁、結膜充血、コプリック斑※、発しん	無	不明	2月18日

※頬の粘膜（口のなかの頬の裏側）に出現する、やや隆起した1ミリメートル程度の白色の小さな斑点。

【患者が利用し、不特定多数の方と接触した可能性のある公共交通機関】

2月20日（金曜日） 10:00発 12:05着

日本航空 JAL313便 羽田空港⇒福岡空港

2月21日（土曜日） 16:45発 18:20着

日本航空 JAL322便 福岡空港⇒羽田空港

※公共交通機関へのお問い合わせは御遠慮ください。

上記日時に公共交通機関を利用された方は、体調に注意し、麻しんを疑う症状（発熱、発疹、咳、鼻水、目の充血等）が現れた場合は、必ず事前に医療機関に連絡し、麻しんの疑いがあることを伝えてください。受診の際は公共交通機関の利用を控えて医療機関の指示に従って受診してください。

本情報提供は、感染症の拡大防止のために行うものですので、患者及び患者家族等の個人情報については、プライバシー保護の観点から本人等が特定されることのないよう、格段の御配慮をお願いいたします。

<都民の皆様へ>

- 麻疹は感染力がきわめて強い感染症で、感染すると約10～12日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れ、2～3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発疹が出現すると言われています。
- 麻疹は予防接種で防げる病気であり、ワクチン接種は個人でできる有効な予防方法です。麻疹の定期予防接種（第1期：1歳児、第2期：小学校就学前の1年間）をまだ受けていない方は、かかりつけ医に相談し、早めに予防接種を受けましょう。
- 麻疹は昨年から、国内で多数報告されています。体調が悪い場合、特に発熱している方は外出を控え、自宅等で療養してください。
- 海外に渡航し、帰国後に発熱や発疹などの麻疹を疑う症状がある場合は、かかりつけ医または医療機関に相談してください。受診の際は、必ず事前に医療機関に麻疹の疑いがあることを連絡の上、公共交通機関の利用を控えてください。

(麻疹に関する基礎知識や予防接種及び相談について、詳細はこちら➡)



(参考) 厚生労働省リーフレット：「麻疹（はしか）」は世界で流行している感染症です。

【出国前】



【帰国後】



「麻疹（はしか）」は世界で流行している感染症です。

麻疹報告数上位10の国々	報告数
インドネシア	14,406
イエメン	9,277
モンゴル	6,483
パキスタン	8,310
インド	8,184
アンゴラ	5,823
ナイジェリア	4,676
メキシコ	3,164
ロシア連邦	2,929
ラオス人民民主共和国	2,859

日本国内で届出された麻疹症例の推定感染地域

国	報告数
インドネシア	7,800
インドネシア/シンガポール	1,180
フィリピン/イタリア	1,180

WHO(世界保健機関) 麻疹報告表 (2025年6月～2025年11月)

2024年11月版 | 一般版

海外へ行く前に

- ✓ 麻疹の予防接種歴を母子手帳などで確認しましょう
- ✓ 定期接種を受けていない方は、接種を検討してください

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください
厚生労働省 感染症対策課 2025/2/10更新

海外から帰国された方へ 帰国後2週間程度は麻疹発症の可能性を考慮し健康状態に注意してください。

麻疹報告数上位100国々	報告数
インドネシア	14,406
イエメン	9,277
モンゴル	6,483
パキスタン	8,310
インド	8,184
アンゴラ	5,823
ナイジェリア	4,676
メキシコ	3,164
ロシア連邦	2,929
ラオス人民民主共和国	2,859

日本国内で届出された麻疹症例の推定感染地域

国	報告数
インドネシア	7,800
インドネシア/シンガポール	1,180
フィリピン/イタリア	1,180

WHO(世界保健機関) 麻疹報告表 (2025年6月～2025年11月)

2024年11月版 | 一般版

帰国後2週間程度は

- ✓ 高熱や全身の発しん、せき、鼻水、目の充血などの症状に注意しましょう

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください
厚生労働省 感染症対策課 2025/2/10更新

【問合せ先】

- 患者発生に関すること
保健医療局感染症対策部防疫課防疫担当 電話 03-5320-4088
- 検査の技術的部分に関すること
東京都健康安全研究センター微生物部 電話 03-3363-3231

(参考) 麻疹 (はしか) とは

1 麻疹とは

麻疹は、麻疹ウイルスによる感染症であり、感染症法上の五類感染症です。

2015年には世界保健機関西太平洋事務局(WPRO)より日本は麻疹排除状態であると認定され、近年の麻疹の発生は輸入症例を端とするものとなります。

世界でも、麻疹の排除(elimination)に向けて、予防接種率の向上等の麻疹対策が強化されていますが、途上国では、いまだに5歳以下の子どもの主な死亡原因となっています。

2 原因と感染経路

病原体は、麻疹ウイルス(measles virus)です。

空気感染が主たる感染経路ですが、その他に、患者の咳やくしゃみに含まれるウイルスを吸い込むことによる「飛まつ感染」、およびウイルスが付着した手で口や鼻に触れることによる「接触感染」もあります。

発症した人が周囲に感染させる期間は、症状が出現する1日前から発疹消失後4日くらいまでとされています。なお、感染力が最も強いのは発疹出現前の期間です。

3 症状

感染力はきわめて強く、麻疹に対する免疫を持っていない人が、感染している人に接すると、ほぼ100%の人が感染します。感染しても発症しない不顕性感染はなく、全て発症します。典型的には、約10～12日間の潜伏期間の後、38℃程度の発熱及びかぜ症状が2～4日続き、その後39℃以上の高熱とともに発疹が出現します。主な症状は、発熱・発疹の他、咳、鼻水、目の充血などです。

また、合併症として、肺炎、中耳炎、稀に、脳炎、失明等があり、肺炎や脳炎は、重症化すると死亡することもあります。死亡する割合も、先進国であっても1,000人に1人とされています。一度感染して発症すると一生免疫が持続すると言われています。

4 治療

特別な治療法は無く対症療法が行われます。感染初期であれば、緊急ワクチン・免疫グロブリンの投与により発症を防止できる可能性もあります。

5 予防のポイント

有効な予防法は、麻疹含有ワクチン接種です。

予防接種法に基づく定期予防接種が計2回(1回目:1歳～2歳未満 2回目:小学校入学前の1年間)行われていますので、対象者の方でまだ接種が済んでいない場合は早めの接種をお願いします。

令和6年度接種率 第1期(1歳児):94.5%

第2期(小学校就学前の1年間):90.4%

(参考) 都内における麻疹患者発生状況

	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
東京都	23	124	2	0	0	10	10	34	8
全国	279	744	10	6	6	28	45	265	43

※東京都の2026年は2月26日までの届出数

※全国の2026年は第7週(2026年2月9日～2月15日)までの累積速報値